

**Bir uygulama ile sezon boyu yabancı ot kontrolü
Daha az mücadele, daha az işçilik maliyeti**

Ürün Grubu : Herbisit
Etkin madde : 500 g/L Indaziflam
Formülasyon : Süspansiyon Konsantré SC

Kullanıldığı bitki ve yabancı otlar

| Bitkiler | Doz |
|---|---|
| Narenciye Bağ Elma Şeftali | 10 ml/da (Çıkış öncesi) |
| Armut Kiraz Zeytin | |
| Yabancı otlar | |
| Melez horoz ibiği <i>Amaranthus hybridus</i> Sürünücü horoz ibiği <i>Amaranthus blitoides</i> K. Köklü tilki kuyruğu <i>Amaranthus retroflexus</i> Semiz otu <i>Portulaca oleracea</i> Demir dikenli <i>Tribulus terrestris</i> Benekli sütleğen <i>Euphorbia nutans</i> Kanarya otu <i>Senecio vernalis</i> K. Yabancı yulaf <i>Avena sterilis</i> Tilki kuyruğu <i>Alopecurus myosuroides</i> Şifa otu <i>Erigeron canadensis</i> Turnagagası <i>Geranium dissectum</i> İtalyan çimi <i>Lolium multiflorum</i> Çoban çantası <i>Capsella bursa pastoris</i> | Serçe dili <i>Stellaria media</i> Yabancı hardal <i>Sinapis arvensis</i> Sirken <i>Chenopodium album L.</i> İt üzümü <i>Solanum nigrum L.</i> Domuz pıtrağı <i>Xanthium strumarium L.</i> Şahtere <i>Fumaria officinalis L.</i> Dançan <i>Echinochloa colonum L.</i> Dikenli yabancı marul <i>Lactuca serriola L.</i> Eşek marulu <i>Sonchus asper L.</i> Yabancı bamyalı <i>Hibiscus trionum L.</i> Dançan <i>Echinochloa crus-galli</i> Ballıbaba <i>Lamium amplexicaule</i> |

Kullanım önerileri

- Alion çıkış öncesi kullanılan bir toprak herbisitidir.
- Etkin bir yabancı ot mücadelesi için iyi bir toprak kaplaması yapmak gerekir.
- Uygulama esnasında toprak yüzeyi en az %70 oranında temiz olmalıdır.
- Uygulama sonrası, ot temizliği için toprak işlemeye gerek yoktur.
- Toprak herbisiti olması nedeniyle, yoğun otlu alanlarda öncelikle kimyasal ya da mekanik ot temizliği yapmakta fayda vardır.
- İyi bir etki için iyi bir toprak kaplaması yapılmalıdır.
- Bağlarda 5 yaş, diğer ürünlerde ise 3 yaş ve üzeri bahçelerde kullanılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Temizliği

Özellikle çok amaçlı (insektisit, fungusit ve herbisit) olarak kullanılan pülverizatörlerin, herbisit uygulamaları sonrasında temizliği, sonraki uygulamalar sonrası oluşabilecek zararlanmaları önlemek açısından son derece önemli bir konudur. Bu nedenle her herbisit uygulamasından sonra tank içerisinde kalan ilaç suyu, uygun bir alanda tankın tahliye kısmından hemen boşaltılmalıdır. Daha sonra toplam tank kapasitesinin %10'u kadar temiz su ile tankın iç yüzeyinin tamamı iyice yıkanıp uygun bir alanda püskürtülmelidir. Tank dibinde kalan ilaç mahfûl tankın tahliye kısmından tekrar boşaltılmalıdır. İlaçlama tankı tekrar temiz su ile ağzına kadar doldurularak püskürtülmeli ve tankın dibinde kalan miktar tahliye edilmelidir. Pülverizatörün filtreleri sökülüp temizlenmelidir. Gerekli durumlarda temizleme işlemi tekrar edilmelidir.

Uyarı

Buradaki bilgiler tanıtım amaçlıdır ve zaman içinde ilaveler ya da değişiklikler olabilir. Bu nedenle en güncel bilginin ürün etiketinde yer alan bilgiler olduğunu ve uygulama öncesi etiket bilgilerinin dikkate alınması gerektiğini unutmayınız.




Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon : 0216 / 528 38 00
Faks : 0216 / 528 38 68
www.tarim.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Ziraî mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD üyesidir.



**Meyve bahçelerinde
bir uygulama ile
sezon boyunca
yabancı ot
kontrolü...**

Alion®

Çok uzun süren etkisi ile Alion, pek çok dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı, çıkış öncesi uygulamalarda kullanabileceğiniz üstün niteliklere sahip, farklı bir **toprak herbisitidir**. Diğer herbisitlere direnç kazanmış yabancı otları da kontrol edebilirsiniz. Hem de ürün güvenliğinden ödün vermeden...

Aktif madde : 500 g/l Indaziflam SC

Kimyasal grubu : Alkylazine

Etki şekli : Selüloz biosentezi engelleyici

Etki spektrumu : Meyve bahçelerinde sorun olan tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar

Doz : 10 ml/da

Neden Alion® ?

► Daha uzun yabancı ot kontrolü

Dekara sadece 10 ml Alion uygulanarak 6 aya varan bir kontrol periyodunun sağlanabildiği gözlemlenmiştir. Alion'un çıkış öncesi topraktaki kalıcı etkisi ile pek çok dar ve geniş yapraklı yabancı ot türü üzerinde uzun bir etki süresine sahip olduğu söylenebilir.

► Daha geniş etki spektrumu

Alion çok geniş bir yabancı ot spektrumuna sahiptir. Alion diğer herbisitlere direnç kazanmış yabancı ot türlerini de kontrol edebilmektedir.

► Farklı etki mekanizması

Alion, çıkış öncesi etkili olan bir toprak herbisitidir. Selüloz oluşumunu, dolayısıyla meristem dokuların gelişimini engeller. Hipokotil ile alınarak yabancı otun çimlenmesini ve toprak yüzeyine çıkışını engeller.

► Daha az ilaçlama daha az masraf

Uzun etkisi sayesinde daha az yabancı ot ilaçlaması yaparak, emek ve para tasarrufuna olanak verir.

